



KÚPSZELETEK


Ellipszispontok és érintők szerkesztése



Legyenek adottak az ellipszis F_1 és F_2 fókuszai, valamint a $2a > |F_1F_2|$ távolság.

- Az F_1F_2 egyenesen O -tól a távolságra kijelöljük a C_1 és C_2 csúcspontokat.
- Az F_1F_2 szakasz felező merőlegesén a fókuszoktól a távolságra adódnak a kis-tengely B_1 és B_2 végpontjai.
- Ha a $2a$ hosszúságú C_1C_2 szakaszt egy F_1 és O közé eső N^+ ponttal két részre osztjuk, akkor a létrejövő, rendre v_1 és v_2 hosszúságú N^+C_1 és N^+C_2 szakaszok ($v_1 + v_2 = 2a$ miatt) egy, az ellipszire illeszkedő (megfelelő) N pont vezérsugarai.
- N^+ -hez hasonlóan további osztópontok is felvehetők F_1 -től O felé haladva növekvő közökkel. Mindegyikhez megszerkeszthetjük a megfelelő ellipszispon-tokat, amelyek a szimmetriák miatt négyesével adódnak. A szimmetriákat az érintők szerkesztése során is kihasználhatjuk.

Az ellipszis egyenlete



$$|C_1C_2| = 2a; |F_1F_2| = 2c; b^2 = a^2 - c^2$$

$$F_1(-c, 0); F_2(c, 0); P(x, y)$$

$$|F_1P| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$|F_2P| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$F_1P + F_2P = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$(x^2 + 2xc + c^2) + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x^2 - 2xc + c^2) + y^2$$


$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - xc$$

$$a^2(x^2 - 2xc + c^2) + a^2y^2 = a^4 - 2a^2xc + x^2c^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ illetve } K(u, v) \text{ középponttal: } \frac{(x-u)^2}{a^2} + \frac{(y-v)^2}{b^2} = 1$$

2. A hiperbola



$2a < |F_1F_2|$; $\{P : ||PF_1| - |PF_2|| = 2a\}$.
 F_1, F_2 : fókuszok, $|F_1F_2| = 2c$ fókusz táv.;
 C_1, C_2 : csúcsok, $|C_1C_2| = 2a$ valós tengely;
 B_1, B_2 : képzetes tengely, $|B_1B_2| = 2b$;
 C_1C_2, B_1B_2 szimmetriatengelyek;
 O szimmetriacentrum, középpont.
 $v_1 = PC_1$ és $v_2 = PC_2$ szakaszok P vezérsugarai. P -ben az érintő belülről felezi v_1 , és v_2 szögét. Az a_1, a_2 aszimptotáknak a csúcsérintőkkel alkotott metszéspontja illeszkedik az F_1F_2 szakasz Thalész-körére.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$(x^2 / a^2) - (y^2 / b^2) = 1 \quad \text{a görbe,}$$

$$y = \pm bx/a \quad \text{az aszimptoták egyenlete.}$$


Hiperbola pontok szerkesztéséhez a valós tengelyen a fókuszról kifelé haladva növekvő közökkel veszünk föl osztópontokat ($1, 2, \dots$). Az ezekhez tartozó görbepontok vezérsugarainak hossza az osztópont és a csúcspontok távolsága. Például $v_1 = 1C_1$ és $v_2 = 1C_2$; a görbe megfelelő pontjai négyesével adódnak.

3. A parabola

$\{P : |PF| = |Pd|\}$. F a fókusz, d a direktrix, $|Fd| = |FD| = p$ a paraméter.

A C csúcspont felezi az FD szakaszt; FD egyenes a szimmetriatengely, a d -re merőleges egyenesek az átmérők. P -ben az érintő felezi a $v = FP$ vezérsugár és a direktrixre bocsátott PT merőleges szögét.

$$y = x^2 / 2p$$



Parabola pontok szerkesztéséhez a tengelyen a csúcsponttól indulva a tengely irányában haladva növekvő közökkel veszünk föl osztópontokat ($1, 2, \dots$). Az ezekhez tartozó görbepontok vezérsugarainak hossza D és az osztópont távolsága lesz (pl. $v = D2$). F körül ezzel a sugárral körívezve metszhetjük ki az osztóponton áthaladó d -vel párhuzamos szelő egyeneséből a görbe megfelelő pontjait.